

Uso Veterinário

Fórmula:

Cada comprimido revestido de 100 mg contém:

Cefadroxil.....50,0 mg.

Excipiente.q.s.p.....100,0 mg.

Generalidades:

O cefadroxil é um antibiótico do grupo das cefalosporinas que atua como bactericida, causando a destruição da parede bacteriana através da ação biológica e bioquímica sobre a mesma. O espectro de ação inclui muitos microrganismos Gram-negativos, pois o cefadroxil, tal como outras cefalosporinas, tem a habilidade de penetrar no envelope externo do bacilo Gram-negativo, ganhando acesso aos sítios alvos pela parede celular. A droga não é inativada pelas penicilinas produzidas por *Staphylococcus* penicilino-resistentes

Indicações:

Para cães e gatos, no controle das infecções do trato respiratório, pele, ossos e do aparelho genitourinário, infecções do aparelho digestivo (inclusive dentárias), por germes sensíveis ao cefadroxil, tais como:

- Pneumonias causadas por *Pasteurella spp.*, *Escherichia coli*, *Streptococcus*

spp., *Klebsiela spp.* e *Staphylococcus spp.*

- Piodermites superficiais e profundas causadas por *Staphylococcus spp.*, *Escherichia coli*, *Proteus mirabilis* e *Clostridium spp.*

- Infecções ósseas - Osteítes e osteomielites causadas por *Pasteurella multocida* e *Escherichia coli*.

- Nefrites, pielonefrites e cistites causadas por *Staphylococcus spp.*, *Escherichia coli*, *Proteus spp.*, *Klebsiela spp.* e *Streptococcus spp.*

- Gastroenterites causadas por *Escherichia coli*, *Proteus spp.*, *Klebsiela spp.* e *Shigella spp.*

Posologia e modo de usar:

Cães: a dose recomendada por via oral é de 25 mg/kg de peso corporal, ou seja, 1 comprimido contendo 50mg de cefadroxil para cada 2 kg de peso, de 12 em 12 horas.

Gatos: a dose recomendada por via oral é de 25 mg/kg de peso corporal, ou seja, 1 comprimido contendo 50mg de cefadroxil para cada 2 kg de peso, em dose única diária.

Em ambas as espécies a duração do tratamento deverá ser de no mínimo 7 dias, não excedendo 30 dias.

Sempre que o produto for utilizado, o

tratamento deverá ser mantido durante pelo menos 48 horas, após a diminuição da febre ou da sintomatologia clínica. Caso não seja observada resposta clínica adequada depois de três dias de tratamento, a terapia deverá ser descontinuada e o caso clínico reavaliado.

As dosagens, bem como a duração do tratamento, poderão ser alteradas de acordo com a gravidade do caso clínico e a critério do Médico Veterinário.

Precauções:

O uso de **MICROLEX®** em pacientes com problemas renais deve ser acompanhado de monitoramento das funções renais pelo médico veterinário.

Contra indicações:

O produto não deve ser administrado a cães e gatos com hipersensibilidade às cefalosporinas.

Os efeitos uso de **MICROLEX®**, em fêmeas em fase de gestação não foram estudados e por este motivo seu uso está contra-indicado.

O Cefadroxil é distribuído através do leite e seu uso em fêmeas lactantes deve ser rigorosamente monitorado.

Efeitos colaterais:

Foram relatados casos raros de náuseas e vômitos durante o tratamento. A administração do produto com alimentos diminui estes efeitos. Diarréia e letargia também foram registradas ocasionalmente.

Venda sob prescrição do Médico Veterinário.

Responsável técnico: Dr. Fábio Alexandre Rigos Alves CRMV-SP. 9321

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 075/2003, em 13/02/2003.

Apresentação:

Cartuchos contendo 1, 2, 3, 10 ou 20 blísteres contendo 7 ou 10 ou 14 ou 20 comprimidos revestidos de 50 mg de cefadroxil cada.

Conservar em local fresco (à temperatura ambiente entre 15°C e 30°C), seco e ao abrigo da luz solar direta, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Proprietário:

CEPAV PHARMA LTDA.

Fabricante:

VANSIL Indústria, Comércio e Representações Ltda.

Rua João Augusto Cirelli, 640 - Distrito Industrial - Descalvado/SP.

CNPJ.: 50.472.547/0001-58

Atendimento ao consumidor:

(11) 3872-2111 info@cepav.com.br
<http://www.cepav.com.br>

Indústria Brasileira